

Notice: Information de l'utilisateur

Phytoden novo Sirop

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que Phytoden novo, sirop et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Phytoden novo, sirop ?
3. Comment prendre Phytoden novo, sirop ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Phytoden novo, sirop ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1 Qu'est-ce que Phytoden novo, sirop et dans quels cas est-il utilisé ?

Phytoden novo est un médicament homéopathique contenant des composants traditionnellement utilisés dans le traitement de la toux, telles que la toux grasse et la toux productive. Facilite l'expectoration et aide à libérer les voies respiratoires inférieures.

Ce médicament homéopathique est utilisé selon les principes de la médecine biorégulatoire.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

2 Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Phytoden novo, sirop ?

N'utilisez jamais Phytoden novo

si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. Phytoden novo contient 7,5 g de saccharose par dose de 10 ml de sirop. Ceci doit être pris en compte chez les patients diabétiques.

Ce médicament contient des parahydroxybenzoates. Ces conservateurs peuvent provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Ce médicament contient de petites quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par dose.

Autres médicaments et Phytoden novo

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament. Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est connue à ce jour.

Phytoden novo avec des aliments et boissons

Pour autant que l'on sache, ce médicament peut être pris en association avec des aliments et des boissons.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il n'existe pas de données concernant l'effet de Phytoden novo sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement. Aucun effet sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement n'est attendu dans la mesure où les dilutions homéopathiques des composants de ce médicament ne présentent aucune toxicité connue. Pour autant que l'on sache, Phytoden novo peut être utilisé selon la posologie indiquée au cours de la grossesse et de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il n'existe pas de données indiquant que Phytoden novo puisse altérer l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines.

Phytoden novo contient du saccharose, du parahydroxybenzoate de Méthyle, du parahydroxybenzoate de propyle et de l'éthanol.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. Phytoden novo contient un mélange de 7,5 g de saccharose par dose de 10 ml de sirop. Ceci doit être pris en compte chez les patients diabétiques.

Ce médicament contient des parahydroxybenzoates. Ces conservateurs peuvent provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Phytoden novo contient de petites quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par dose.

3. Comment prendre Phytoden novo, sirop ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie pour adultes :

Dose recommandée : 10 ml de sirop, 3 à 5 fois par jour.

Utilisation chez les enfants et les adolescents jusqu'à 18 ans

L'administration de ce médicament aux enfants de 2 à 6 ans doit être fortement limitée.

L'administration de ce médicament aux enfants de moins de 2 ans ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement et uniquement après avoir consulté un médecin qui déterminera la dose à administrer.

Adolescents de 12 à 18 ans :

Une dose de 10 ml de sirop, 3 à 5 fois par jour.

Enfants de 6 à 12 ans :

Une dose de 5 ml de sirop, 3 à 5 fois par jour.

Enfants de 2 à 6 ans :

Une dose de 2,5 ml de sirop, 3 à 5 fois par jour.

L'emballage est muni d'un godet doseur indiquant les doses de 2,5 ml, 5 ml et 10 ml.

Ne jamais dépasser la dose prescrite. Rincer le godet doseur à l'eau après utilisation.

Si vous avez pris plus de Phytoden novo que vous n'auriez dû

Selon l'homéopathie, l'effet est lié à la dilution et non à la posologie. Si vous avez pris plus de Phytoden novo que la dose recommandée, l'effet ne sera pas plus fort. Si vous avez pris plus de Phytoden novo que nécessaire, il n'y a pas d'effets secondaires à prévoir.

Si vous avez encore des questions, contactez votre pharmacien, votre médecin ou le Centre Antipoisons (070/245 245).

Si vous avez oublié de prendre Phytoden novo

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Phytoden novo

L'arrêt du traitement n'entraîne pas d'effets particuliers.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Jusqu'à présent aucun effet indésirable n'est connu.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/40

B-1060 Bruxelles

Site internet: www.afmmps.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Phytoden novo, sirop

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver dans l'emballage d'origine. Conserver le flacon soigneusement fermé. A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. Les deux premiers chiffres indiquent le mois et les quatre suivants, l'année. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations**Ce que contient Phytoden novo**

Les substances actives de 100 g de solution sont : Antimonium tartaricum D6, Ipecacuanha D6, Kalium bichromicum D6, Pulsatilla pratensis D6 à 2,5 g.

Les autres composants (excipients) sont: Sirupus simplex, Tolutani balsami sirupus concentratus, Papaveris rhoeados floris extractum fluidum, Methylis parahydroxybenzoas, Propylis parahydroxybenzoas, Propylenglycolum, Ethanolum.

Comment se présente Phytoden novo et contenu de l'emballage

Sirop à administrer par voie orale.

Flacon en verre avec godet doseur.

Emballage de 200 ml de sirop.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Heel Belgium nv
B-9031 Drogen (Gent)
Tél.: 09/265 95 65
Fax: 09/223 00 76
E-mail: info@heel.be

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

982 CH 516 F8

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est septembre 2016.