

Producteigenschappen

Meer weten over CurcuDyn® Forte? Ga naar www.curcudyn.eu

CurcuDyn® Forte bevat kurkuma-, boswellia- en gemberextracten die bijdragen tot het behoud van soepele gewrichten. CurcuDyn® Forte bevat ook vitamine D die bijdraagt tot de normale werking van de spieren, en vitamine C die bijdraagt tot de normale werking van het kraakbeen.



Sojavrij



Geschikt
voor
vegetariërs



Lactosevrij



Glutenvrij

Ingrediënten

Ingrediëntenoverzicht

Ingrediënten per capsule	Vorm/component	Hoeveelheid	%RI
Kurkumawortelextract (Curcuma longa L.)		140 mg	
	Curcuminoïden	100 mg	
	Turmerones	11 mg	
Boswellia extract (Boswellia serrata Roxb. Ex Colebr.)		65 mg	
	AKBA	29 mg	
Gemberwortelextract (Zingiber officinale Rosc.)		40 mg	
Vitamine D	Cholecalciferol	2,5 µg	50%
Vitamine C	Ascorbinezuur	16 mg	20%

Bevat ook:

Fenegriek galactomannanen (Trigonella foenumgraecum L.), Dicalciumfosfaat, Hydroxypropylmethylcellulose, Rijstextract (Oryza sativa L.), Microkristallijne cellulose, Ijzeroxide, Tricalciumfosfaat, Zonnebloemolie (Helianthus annuus)

Gebruik en dosering

1 capsule per dag

Voorzorgen

Niet aangewezen bij gebruik van orale anticoagulantia. Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 12 jaar, zwangere vrouwen en tijdens de borstvoeding. In geval van lever- en galwegaandoeningen wordt het gebruik afgeraden.

Veelgestelde vragen over dit product

Vanaf welke leeftijd kunnen CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte gebruikt worden?

CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte kan gebruikt worden vanaf 18 jaar of zoals aanbevolen door uw arts.

Wat zijn de neveneffecten van CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte?

CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte worden over het algemeen goed verdragen.

Kunnen CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte ontstekingsremmers vervangen?

CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte zijn voedingssupplementen en kunnen helpen om de gewrichten te ondersteunen. CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte kunnen in bepaalde gevallen in combinatie met ontstekingsremmers gebruikt worden. Raadpleeg hiervoor echter een arts alvorens dit op te starten

Hoe lang dient men CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte in te nemen alvorens effect te hebben?

Het is aangewezen CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte minimaal 2 weken te gebruiken

Waarom worden cofactoren aan CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte toegevoegd?

Cofactoren verbreden de werking van het product.

Kurkuma wordt moeilijk door het lichaam opgenomen. Bemoedigt het toevoegen van extra ingrediënten dan de opname niet?

Nee, integendeel. De cofactoren verbreden de werking van CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte en hebben geen nadelig effect op de biologische beschikbaarheid.

Wat is het voordeel van bio-geoptimaliseerd kurkuma-extract?

Kurkuma is vetoplosbaar. Zonder optimalisatie zou u dagelijks zeer grote hoeveelheden kurkuma moeten innemen om effect te voelen.

Ik heb last van mijn spieren. Kan CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte me helpen?

Mogelijks is MetaRelax® meer aangewezen. MetaRelax® is een magnesiumcomplex op basis van magnesiumglycerofosfaat dat ondersteuning biedt voor de spieren. MetaRelax® wordt bovendien bijzonder goed verdragen in maag en darmen.

Mag CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte genomen worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding?

CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte bevatten plantenextracten waardoor voorzichtigheid is geboden. Vraag advies aan uw arts alvorens CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte in te nemen.

Ik gebruik antistollingsmiddelen. Mag ik CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte nemen?

Kurkuma kan een invloed hebben op de bloedstollingsparameters. Dit effect is niet altijd wenselijk. Als CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte samen genomen wordt met antistollingsmiddelen (anticoagulantia) dan kan dit een bijkomend bloedverdünnend effect hebben. Dit effect is afhankelijk van het type antistollingsmiddel. Het is om die reden noodzakelijk uw arts te contacteren en zijn advies te vragen alvorens CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte samen met antistollingsmiddelen te nemen.

Mag CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte samen genomen worden met glucosamine, chondroïtine, MSM...?

Ja, deze combinatie kan in bepaalde gevallen nuttig zijn.

Zijn er situaties waarbij CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte niet aangewezen zijn?

CurcuDyn® en CurcuDyn® zijn niet aangewezen bij **zwangerschap, borstvoeding**, gebruik van **orale anticoagulantia** en **obstructie** van de **galwegen**. Bespreek in deze gevallen het gebruik eerst met uw arts of apotheker. Onderbreek het gebruik **in geval van aanhoudende diarree**.

Wat is het verschil tussen CurcuDyn® en CurcuDyn® Forte?

CurcuDyn® is een hoog gedoseerd, bio-geoptimaliseerd kurkuma-extract aangevuld met gember, vitamine C en vitamine D. Om de opneembaarheid van kurkuma te verhogen, wordt de miceltechnologie gebruikt. **Gebruik:** 2 capsules per dag.

CurcuDyn® Forte bevat ook nog een 3e goed bestudeerde plant: het Boswellia serrata-extract. Zo biedt CurcuDyn® Forte een synergetische combinatie van 3 krachtige plantenextracten om de gewrichten soepel te houden. Om de opneembaarheid van kurkuma én boswellia te verhogen, wordt gebruik gemaakt van een plantaardig complex op basis van fenegriek waarbij de nutriënten gespreid vrijkomen. **Gebruik:** 1 capsule per dag.

Wie heeft er baat bij gebruik van CurcuDyn® of CurcuDyn® Forte?

Iedereen die zijn gewrichten soepel wenst te houden.

De informatie werd geschreven door en is bestemd voor mensen die beroepsmatig met gezondheid en voeding bezig zijn. Ze is niet bestemd of bedoeld voor leken/consumenten. De diagnose en behandeling van de ziekte moet gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een erkende gezondheidsprofessional.

© 2020 Metagenics