

Flexofytol®



GEBRUIK

Flexofytol®, gebaseerd op een **bioactief extract van kurkuma**, helpt de soepelheid van de gewrichten te behouden en de veroudering van het kraakbeen te beperken.

WERKINGSMECHANISME

De wortel van de kurkuma plant bevat een geheel aan bestanddelen die «curcuminoïden» worden genoemd en waarvan curcumine de belangrijkste is. Curcumine is een krachtig antioxidant die bijdraagt tot de soepelheid van de gewrichten en pezen.

Flexofytol® bevat een **bioactief kurkuma-extract** gestandaardiseerd in curcumine en wetenschappelijk bestudeerd bij meer dan 2.800 mensen in België. Het formuleringsproces van dit extract garandeert een optimaal effect om u te helpen vrij te blijven bewegen. Flexofytol® stelt meer dan 93% van de gebruikers tevreden*.

INGREDIËNTEN per capsule

Emulgator (polysorbaat 80) • Omhusel (rundergelatine) • bevochtigmiddel (glycerol) • **bioactief extract van Curcuma longa gestandaardiseerd op 42 mg curcumine** • zuurteregelaar (citroenzuur) • water • kleurstoffen (karmijnzuur, ijzer oxiden).



Tilman®

TILMAN S.A. • B-5377 Baillonville +32 (0)84 230 360 • www.tilman.be

NUT/PL 31/100

GEBRUIKSAANWIJZING

GEWRICHTEN

VAN 6 TOT 12 JAAR

Startkuur:
2 1/2's morgens
gedurende 1 maand

Onderhoudskuur:
1 1/2's morgens

OUDER DAN 12 JAAR

Startkuur:
2 1/2's morgens
en 's avonds
gedurende 1 maand

Onderhoudskuur:
2 1/2's morgens

PEZEN

VAN 6 TOT 12 JAAR

2 1/2's morgens
en 's avonds
gedurende 1 week.

OUDER DAN 12 JAAR

4 1/2's morgens
en 's avonds
gedurende 1 week.

Flexofytol® mag niet gebruikt worden voor kinderen van minder dan 6 jaar.

Flexofytol® mag gedurende lange perioden gebruikt worden zonder maagcomplicaties.

VOORZORGEN

- Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding, of bij obstructie van de galwegen.
- Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia.
- Het gebruik onderbreken in geval van aanhoudende diarree.

Bewaren beneden 30°C.

www.flexofytol.be

* Henrotin en al. SpringerPlus 2013, 2:56