

Notice: information de l'utilisateur

Hexomedine solution 1 mg/ml solution pour application cutanée Hexomedine transdermique 1,5 mg/ml solution pour application cutanée

Hexamidine di-isétionate

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 à 4 jours.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Hexomedine et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Hexomedine?
3. Comment utiliser Hexomedine?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Hexomedine?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Hexomedine et dans quel cas est-il utilisé?

L'Hexomedine est un désinfectant à usage externe.

Hexomedine solution est indiquée dans le traitement adjuvant d'infections de la peau (voie cutanée) et des muqueuses infectées ou susceptibles de s'infecter.

Hexomedine transdermique (à travers la peau) est utilisé dans le traitement adjuvant d'infections localisées de la peau, notamment les infections des follicules pileux (folliculites) et les ongles infectés.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 à 4 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Hexomedine?

N'utilisez jamais Hexomedine

- Si vous êtes allergique aux diamidines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Pour désinfecter la peau avant une injection ou pour stériliser des objets.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Hexomedine.

- Ne pas utiliser au-delà de 5 jours, en particulier si vous l'utilisez:
 - sous un pansement qui empêche la déshydratation de la plaie (pansement occlusif)
 - sur une peau endommagée (p.ex. une peau brûlée)
 - sur les muqueuses
 - sur une peau de nourrisson
- Evitez le contact avec les yeux.
- Ne pas utiliser Hexomedine transdermique sur des plaies à vif.
- Hexomedine transdermique contient du propylène glycol. Ceci peut provoquer une irritation cutanée.

Si vous utilisez encore d'autres médicaments, veuillez aussi lire la section « Autres médicaments et Hexomedine ».

Autres médicaments et Hexomedine

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

L'usage concomitant ou successif d'autres antiseptiques ne rapporte aucun avantage.

Hexomedine avec des aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Concernant l'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement, aucun effet nocif n'a été rapporté à ce jour.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

Hexomedine transdermique contient du propylène glycol. Ceci peut provoquer une irritation cutanée.

3. Comment utiliser Hexomedine?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de:

Hexomedine solution

A utiliser pure, donc non diluée, 2 à 3 fois par jour, en application locale ou en pansement humide, ou en bain local.

Hexomedine transdermique

A utiliser pure, donc non diluée, 2 à 3 fois par jour en pansement humide pendant 30 à 45 minutes, ou baignez le doigt directement dans la solution dans le flacon pendant 1 à 3 minutes. Le flacon est conçu pour y tremper le doigt infecté. Ne pas utiliser la solution transdermique sur des plaies à vif ou sur les muqueuses, ni sous un pansement qui empêche la déshydratation de la plaie (pansement occlusif).

Ne pas utiliser au-delà de 5 jours, en particulier si vous l'utilisez sous un pansement qui empêche la déshydratation de la plaie (pansement occlusif), sur une peau endommagée (p.ex. une peau brûlée), sur les muqueuses ou sur une peau de nourrisson.

Si vous avez utilisé plus de Hexomedine que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé trop de Hexomedine, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (**070/245.245**).

Si le produit est avalé accidentellement, il est recommandé d'administrer du charbon actif (agent de liaison puissant) et de faire procéder éventuellement à un lavage d'estomac. Dans le cas où la victime aurait une respiration déprimée, il faut la conduire aussi vite que possible à l'hôpital.

Si vous oubliez d'utiliser Hexomedine

Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser Hexomedine

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez devenir hypersensible au produit. Ne l'utilisez donc pas trop ou trop longtemps, ni sur une peau déjà lésée ou fortement abîmée.

L'hypersensibilité au produit peut se manifester sous forme de picotements, démangeaisons, brûlures, peau sèche. Exceptionnellement, des réactions cutanées allergiques et même des réactions d'hypersensibilité sévères (réactions anaphylactiques) peuvent se manifester.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Hexomedine?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Durée d'utilisation après ouverture: 15 jours.

Si le flacon « Hexomedine transdermique » est utilisé pour y tremper un doigt infecté, ne l'utilisez pas au-delà de 5 jours.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Hexomedine?

Hexomedine solution:

- La substance active est: hexamidine di-isétionate 1 mg/ml.
- Les autres composants sont: alcool isopropylique et eau purifiée.

Hexomedine transdermique:

- La substance active est: hexamidine di-isétionate 1,5 mg/ml.
- Les autres composants sont: éthanol 96%, propylène glycol, methylal, nonoxinol 9 et eau purifiée (Voir rubrique 2 « Hexomedine transdermique contient du propylèneglycol »).

Aspect de Hexomedine et contenu de l'emballage extérieur

Hexomedine solution: flacons de 45 ml ou 250 ml de solution transparente pour application cutanée.

Hexomedine transdermique: flacon de 45 ml de solution transparente pour application cutanée.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Melisana SA
Avenue du Four à Briques 1
B-1140 Bruxelles

Fabricant

Hexomedine solution:
Natterman & Cie GmbH
Nattermannallee 1
D-50829 Cologne
Allemagne

Hexomedine transdermique:

Aventis Pharma SA
Avenida de Leganes 62
ES-28925 Alcorcón
l'Espagne

Unither Liquid Manufacturing
1-3 Allée de la Neste
Z.I. en Sigal
31770 Colomiers
France

Numéro(s) de l'autorisation de mise sur le marché

Hexomedine solution: BE002642
Hexomedine transdermique: BE002466

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2015.