

MEDICA KEELTABLETTEN MENTHOL, 5 mg/1 mg, zuigtabletten
Chloorhexidine hydrochloride - Lidocaïne hydrochloride

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.



- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 à 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Waarvoor wordt Medica keeltabletten menthol gebruikt?
2. Wanneer mag u Medica keeltabletten menthol niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Medica keeltabletten menthol?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Medica keeltabletten menthol?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

1. WAARVOOR WORDT MEDICA KEELTABLETTEN MENTHOL GEBRUIKT?

Medica keeltabletten menthol is een zuigtablet voor plaatselijke werking in mond en keelholte.

Het is een ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel.

Medica keeltabletten menthol is aangewezen bij:

- Behandeling van de symptomen van keelpijn, rode keel, aandoeningen van de keelholte gepaard gaande met irritatie;
- In geval van een bacteriële infectie met koorts, is een aanvullende behandeling nodig;
- Medica keeltabletten menthol bevat geen suiker en is dus ook geschikt voor suikerzieken.

2. WANNEER MAG U MEDICA KEELTABLETTEN MENTHOL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u Medica keeltabletten menthol niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

- Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Medica keeltabletten menthol?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Medica keeltabletten menthol gebruikt.

- Medica keeltabletten menthol mag niet langdurig, ononderbroken of steeds opnieuw gebruikt worden. Beperk het gebruik tot strikt noodzakelijke verlichting van pijn en irritatie.
- Als een te hoge dosis (meer dan 20 tabletten per dag) wordt gebruikt, is er een klein risico op vermindering van de controle op de slikreflex.
- Bij jonge kinderen die reeds een aanval van stuipen doorgemaakt hebben. Dit geneesmiddel bevat namelijk menthol.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Kinderen

Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Medica keeltabletten menthol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

- Niet gelijktijdig gebruiken met geneesmiddelen voor lichte vormen van Alzheimer (cholinesteraseremmers).
- Niet gelijktijdig gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u bovengenoemde voorzorgen respecteert, mag u Medica keeltabletten menthol gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding. Stel uw arts op de hoogte van het gebruik van dit geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Medica keeltabletten menthol bevat menthol en sorbitol

Medica keeltabletten menthol bevat menthol: wees voorzichtig bij kinderen die reeds een aanval van stuipen doorgemaakt hebben.

Medica keeltabletten menthol bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Sorbitol kan een licht laxerend effect hebben. De calorische waarde is 2,6 kcal/g sorbitol.

3. HOE GEBRUIKT U MEDICA KEELTABLETTEN MENTHOL?

Gebruik Medica keeltabletten menthol altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen: 6 tot 10 tabletten per dag.

Kinderen vanaf 6 jaar: 3 tot 5 tabletten per dag.

De tablet langzaam in de mond opzuigen.

Dit geneesmiddel mag niet langdurig gebruikt worden. Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 3 à 4 dagen.

Heeft u te veel van Medica keeltabletten menthol gebruikt?

Wanneer u te veel van Medica keeltabletten menthol heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Dit geneesmiddel bevat slechts een fractie van de toxische dosis. Bij goed gebruik zijn de risico's op overdosering zeer klein.

Symptomen van overdosering zijn: rusteloosheid, oorsuizingen, ademhalingsmoeilijkheden, verstoring van het hartritme, vermindering van de controle op de slikreflex.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Medica keeltabletten menthol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- Zeer zelden: allergische huid- en slijmvliesreacties.
- Er kunnen smaakstoornissen, een branderig gevoel aan de tong en ernstige allergische reacties (anafylactische reacties) optreden.
- Bij langdurig, ononderbroken gebruik kan een bruinverkleuring van de tanden optreden. Deze verkleuring is echter gemakkelijk verwijderbaar.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U MEDICA KEELTABLETTEN MENTHOL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik Medica keeltabletten menthol niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos/de blisterverpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.

Welke stoffen zitten er in Medica keeltabletten menthol?

- De werkzame stoffen in Medica keeltabletten menthol zijn: chloorhexidine hydrochloride 5 mg - lidocaïne hydrochloride 1 mg.
- De andere stoffen in Medica keeltabletten menthol zijn: sorbitol - magnesiumstearaat - watervrij citroenzuur - menthol.

Hoe ziet Medica keeltabletten menthol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Medica keeltabletten menthol is verkrijgbaar in een doos met 40 zuigtabletten in blisterverpakking en in een doos met 36 zuigtabletten in geperforeerde eenheidsblisterverpakking.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE172435

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

In hetzelfde gamma bestaat ook:

MEDICA KEELTABLETTEN LEMON, 5 mg/1 mg, zuigtabletten: Ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel voor mond en keelholte

MEDICA KEELSPRAY MENTHOL, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, spray voor oromucosaal gebruik: Ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel voor mond en keelholte

MEDICA KEELSPRAY LEMON, 20 mg/10 ml; 5 mg/10 ml, spray voor oromucosaal gebruik: Ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel voor mond en keelholte

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 11/2012.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2012