

NOTICE**Notice : information du patient****EUPHON Sirop**

Sisymbrium officinale Scop. (Erysimum)

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- ⌚ Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- ⌚ Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- ⌚ Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- ⌚ Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que Euphon sirop et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Euphon sirop
3. Comment prendre Euphon sirop
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Euphon sirop?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE EUPHON SIROP ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Euphon Sirop est utilisé pour soulager la toux, après que toute maladie sévère soit écartée.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER EUPHON SIROP?**N'utilisez jamais Euphon sirop :**

- Chez les enfants de moins de 3 ans.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au Sisymbrium officinale Scop. (Erysimum) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Euphon.

- Pas d'utilisation prolongée sans avis médical.
- Chez le diabétique ou en cas de régime hypoglycémique, tenir compte de la teneur en saccharose : 10,28 g de saccharose par 15 ml – 3.4 g de saccharose par 5 ml.

Autres médicaments et Euphon

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Euphon avec des aliments et boissons

Sans objet

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament

Par précautions, Euphon sirop n'est pas recommandé pendant la grossesse et chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception et pendant l'allaitement

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucun cas de modification de la vigilance n'a été rapporté.

Euphon contient :

- **Saccharose** : Contient 10,28g g de saccharose par dose de 15 ml. Ceci doit être pris en compte chez les patients diabétiques.
- **Ethanol** : Ce médicament contient 2,7 % (V/V) de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu'à 320 mg par dose de 15 ml.
Dangereux en cas d'utilisation chez les sujets alcooliques.
- A prendre en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques. **Parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et parahydroxybenzoate de propyle (E216)**. Peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

3. COMMENT PRENDRE EUPHON SIROP?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Voie orale

La dose recommandée est :

- Adultes : 1 cuillère à soupe (15 ml) 3 à 4 fois par jour, après les repas.

Utilisation chez les enfants

- Enfants âgés de 3 à 6 ans : 1 cuillère à café (5 ml) 3 fois par jour, après les repas.
- Enfants âgés de 6 à 12 ans : 2 cuillères à café (10 ml) 3 fois par jour, après les repas.
- Enfants âgés de plus de 12 ans : 1 cuillère à soupe (15 ml) 3 fois par jour, après les repas.

N'utilisez jamais Euphon sirop chez les enfants de moins de 3 ans.

Si vous avez pris plus de Euphon sirop que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop d'Euphon sirop, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245)

En cas de surdosage, un traitement symptomatique s'impose.

Si vous oubliez de prendre Euphon sirop

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Euphon sirop

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Euphon sirop peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Belgique :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance

| | |
|---------------------------------------|---|
| Avenue Galilée 5/03 1210 BRUXELLES | Boîte Postale 97 1000 BRUXELLES Madou |
|---------------------------------------|---|

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be

e-mail: adr@afmps.be

Luxembourg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy
Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB)
CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois

Rue du Morvan

54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX

Tél: (+33) 3 83 65 60 85 / 87

e-mail: crpv@chru-nancy.fr

ou

Direction de la Santé
Division de la Pharmacie et des Médicaments
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
Tél.: (+352) 2478 5592
e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link pour le formulaire : <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER EUPHON SIROP

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25° C.

A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et le flacon après la mention EXP (mois / année). La date péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Euphon sirop

- La substance active est le *Sisymbrium officinale* Scop. (*Erysimum*). 1 ml de sirop contient 5,5 mg/ml de *Sisymbrium officinale* Scop. (*Erysimum*) [Parties aériennes fleuries séchées] (extrait sec aqueux sur maltodextrine – 6 parties de plante pour 1 partie d'extrait).
- Les autres composants sont : Rouge cochenille A, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, acide citrique monohydraté, arôme naturel de framboise, saccharose, alcool, eau purifiée q.s.p. 100 ml.

Aspect de Euphon sirop et contenu de l'emballage extérieur

Sirop, présenté en flacon verre de 200 ml.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché

Mayoly Benelux
Rue du cours d'Eau 10
B- 1428 Lillois

Fabricant : Sophartex
Rue du Pressoir 21
F - 28500 Vernouillet

Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché : BE262175

Mode de délivrance : Délivrance libre.

La date de l'approbation de la notice est novembre 2021.