

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker



ArnicaforceMed forte gel

Arnica Montana L.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 8 weken onafgebroken gebruik niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is A.Vogel ArnicaforceMed forte gel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u A.Vogel ArnicaforceMed forte gel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u A.Vogel ArnicaforceMed forte gel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u A.Vogel ArnicaforceMed forte gel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is A.Vogel ArnicaforceMed forte gel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

A.Vogel ArnicaforceMed forte gel is een traditioneel kruideneesmiddel dat wordt toegepast bij:

- pijn
- ontstekingen als gevolg van reuma
- pijnlijke gewrichten
- rugpijn
- spierpijn
- spierverrekking
- stijve spieren en gewrichten
- peesontsteking
- kneuzingen
- zwellingen als gevolg van kneuzingen
- verrekking
- verstuiking
- blauwe plekken als gevolg van stoten

De toepassing is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring.

Wordt uw klacht na 8 weken niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u A.Vogel ArnicaforceMed forte gel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u A.Vogel ArnicaforceMed forte gel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Bij overgevoeligheid voor planten van de familie der

Samengesteldbloemigen (Asteraceae of Compositae familie).

- Alleen voor cutaan gebruik. Niet gebruiken op wondjes of geïrriteerde huid. Vermijd contact met de ogen, de neus, de mond en andere gevoelige gebieden. Stop het gebruik als roodheid, irritatie of droge huid optreden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met A.Vogel ArnicaforceMed forte gel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

De aangegeven dosering niet overschrijden. Alleen voor cutaan gebruik. Niet gebruiken op wondjes of geïrriteerde huid. Vermijd contact met de ogen, de neus, de mond en andere gevoelige gebieden. A.Vogel ArnicaforceMed forte gel kan irritaties veroorzaken. Stop het gebruik als roodheid, irritatie of droge huid optreden.

Kinderen
A.Vogel ArnicaforceMed forte gel wordt niet aangeraden bij kinderen onder de leeftijd van 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast A.Vogel ArnicaforceMed forte gel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? Tijdens het gebruik van A.Vogel ArnicaforceMed forte gel kan er gewoon gegeten en gedronken worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap: alhoewel geen bijwerkingen zijn waargenomen, wordt het gebruik tijdens de zwangerschap afgeraden, tenzij onder toezicht van een arts. Overleg eerst met uw arts voor gebruik van A.Vogel ArnicaforceMed forte gel tijdens de zwangerschap.

Lactatie: het is niet geweten of de actieve bestanddelen van Arnica extracten in de moedermelk worden opgenomen. Het gebruik tijdens de periode van lactatie is dus afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit traditionele kruideneesmiddel beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

3. Hoe gebruikt u A.Vogel ArnicaforceMed forte gel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Tenzij anders is voorgeschreven de huid van het aangetaste oppervlak 2 tot 4 x daags met een dun laagje gel (2 - 10 cm) zachtjes inwrijven. Als de klachten verergeren of wanneer na 2 weken onafgebroken gebruik geen verbetering van

de klachten wordt bemerkt, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u te veel van A.Vogel ArnicaforceMed forte gel gebruikt?

Wanneer u te veel van A.Vogel ArnicaforceMed forte gel heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van A.Vogel ArnicaforceMed forte gel heeft gebruikt, kan irritatie optreden waarbij de huid rood wordt. Stop dan onmiddellijk het gebruik.

In het onwaarschijnlijke geval van inname, kunnen ten gevolge van het irriterende effect van Arnica, vergiftigingsverschijnselen optreden zoals gastro-intestinale en zenuwstelsel verstoringen; draaierigheid, diarree, rillingen en hartkloppingen. Ademhalingsmoeilijkheden kunnen voorkomen bij inname van een zeer hoge dosis. Behandeling van de overdosis: de maag moet leeggemaakt worden door leegpompen of spoelen indien de patiënt nog niet heeft gebrakt. Verzachtende drank zoals melk moet gegeven worden.

Bent u vergeten A.Vogel ArnicaforceMed forte gel te gebruiken?

Wanneer u de gel bent vergeten aan te brengen ga verder met het gebruik zoals voorheen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van A.Vogel ArnicaforceMed forte gel

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende klachten komen vaak ($\geq 1/100$, $< 1/10$) voor: Jeuk, huiduitslag of huidreacties. Stop onmiddellijk het gebruik en als deze reacties u verontnemen praat met uw arts of apotheker.

Raadpleeg uw arts indien de symptomen tijdens het gebruik van dit geneesmiddel aanhouden.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg-afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u A.Vogel ArnicaforceMed forte gel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in A.Vogel ArnicaforceMed forte gel?

- De werkzame stof in dit middel is een extract van verse Arnica montana bloemen, 500 mg extract per 1 g gel.
- De andere stoffen in dit middel zijn ethanol, gezuiverd water, glycerol, ammonium acryloyldimethyltauraat/VP copolymeer.

Hoe ziet A.Vogel ArnicaforceMed forte gel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De gel is verpakt in een tube met 100 mg gel.

Registratiehouder en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
A.Vogel N.V.
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen

Fabrikant
A.Vogel B.V.
P.O. Box 33
NL 8080 AA Elburg
Nederland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder:
A.Vogel N.V.
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen
Tel: +32 (0)13 35 89 40
e-mail: info@avogel.be

Afleveringswijze
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Registratienummer

BE-TU488026

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 07/2019.

Notice: information de l'utilisateur



ArnicaforceMed forte gel

Arnica Montana L.

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous sentez moins bien après 8 semaines.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que A.Vogel ArnicaforceMed forte gel et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser A.Vogel ArnicaforceMed forte gel?
3. Comment utiliser A.Vogel ArnicaforceMed forte gel?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

5. Comment conserver A.Vogel ArnicaforceMed forte gel?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que A.Vogel ArnicaforceMed forte gel et dans quel cas est-il utilisé?

A.Vogel ArnicaforceMed forte gel est un médicament traditionnel à base de plantes utilisé lors de :

- douleur
- inflammation consécutive à des rhumatismes
- douleurs articulaires
- maux de dos
- douleurs musculaires
- claquage musculaire
- raideurs musculaires et articulaires
- inflammation des tendons
- ecchymoses
- gonflement consécutif à des ecchymoses
- entorse
- foulure
- hématomes consécutifs à un coup

Son application est exclusivement basée sur la longue expérience de son utilisation.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous sentez moins bien après 8 semaines.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser A.Vogel ArnicaforceMed forte gel?

N'utilisez jamais A.Vogel ArnicaforceMed forte gel

- si vous êtes allergique à l'extrait de fleurs fraîches d'Arnica montana ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- en cas d'hypersensibilité aux plantes de la famille des Compositae (Asteraceae ou Compositae).

• Uniquement pour application cutanée. Ne pas utiliser sur des plaies ou des zones de peau irritée. Éviter tout contact avec les yeux, le nez, la bouche et les autres zones sensibles. Cesser de l'utiliser en cas de rougeur, d'irritation ou de sécheresse de la peau.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser A.Vogel ArnicaforceMed forte gel.

Ne pas dépasser la dose indiquée. Uniquement pour application cutanée. Ne pas utiliser sur des plaies ou des zones de peau irritée. Éviter tout contact avec les yeux, le nez, la bouche et les autres zones sensibles. A.Vogel ArnicaforceMed forte gel peut provoquer des irritations. Cesser de l'utiliser en cas de rougeur, d'irritation ou de sécheresse de la peau.

Enfants

A.Vogel ArnicaforceMed forte gel est déconseillé chez les enfants de moins de 12 ans.

Autres médicaments et A.Vogel ArnicaforceMed forte gel

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Aucune interaction connue avec d'autres médicaments.

A.Vogel ArnicaforceMed forte gel avec des aliments, boissons et de l'alcool
On peut manger et boire normalement pendant l'utilisation de A.Vogel ArnicaforceMed forte gel.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse: bien qu'aucun effet indésirable n'ait été constaté, l'utilisation pendant la grossesse est déconseillée, sauf sous la supervision d'un médecin. Demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser A.Vogel ArnicaforceMed forte gel pendant la grossesse.

Allaitement: on ignore si la substance active des extraits d'arnica passe dans le lait maternel. L'utilisation pendant l'allaitement est dès lors déconseillée.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament traditionnel à base de plantes n'affecte pas l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. Comment utiliser A.Vogel ArnicaforceMed forte gel?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Sauf prescription contraire, appliquer délicatement 2 à 4 x par jour une fine couche de gel (2 à 10 cm) sur la zone de peau atteinte. Si les symptômes s'aggravent ou si l'on ne constate aucune amélioration après 2 semaines d'utilisation, consulter un médecin.

Si vous avez utilisé plus de A.Vogel ArnicaforceMed forte gel que vous n'auriez dû
Si vous avez utilisé trop de A.Vogel ArnicaforceMed forte gel, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

Si vous avez utilisé plus que la dose recommandée de A.Vogel ArnicaforceMed forte gel, cela peut provoquer une irritation se manifestant par une rougeur de la peau. Cessez alors immédiatement de l'utiliser.

Dans l'éventualité fort improbable d'une ingestion, suite à l'effet irritant de l'arnica, des signes d'intoxication tels que des troubles gastro-intestinaux et au niveau du système nerveux sont susceptibles de se manifester: vertiges, diarrhée, frissons et palpitations cardiaques. Des difficultés respiratoires peuvent survenir en cas d'ingestion de très fortes doses. Traitement en cas de surdosage: vider l'estomac à l'aide d'une pompe à vide ou par rinçage si le patient n'a pas encore vomé. Administrer des boissons émoullientes telles que du lait.

Si vous oubliez d'utiliser A.Vogel ArnicaforceMed forte gel

Si vous avez oublié d'appliquer le gel, poursuivez l'utilisation normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser A.Vogel ArnicaforceMed forte gel

Il n'y a pas d'effets à attendre suite à l'arrêt du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les symptômes suivants surviennent fréquemment ($\geq 1/100$, $< 1/10$): Démangeaisons, éruption cutanée ou réactions cutanées. Cessez immédiatement l'utilisation et, si ces réactions vous inquiètent, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Consultez votre médecin si les symptômes persistent malgré l'utilisation de ce médicament.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver A.Vogel ArnicaforceMed forte gel

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Conserver dans l'emballage extérieur.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient A.Vogel ArnicaforceMed forte gel

- La substance active est un extrait de fleurs fraîches d'Arnica montana, 500 mg d'extrait par g de gel.
- Les autres composants sont éthanol, eau purifiée, glycérol, ammonium acryloyldiméthyltaurate/VP copolymère.

Aspect de A.Vogel ArnicaforceMed forte gel et contenu de l'emballage extérieur

Le gel est conditionné dans un tube contenant 100 mg de gel.

Titulaire de l'enregistrement et fabricant

Titulaire de l'enregistrement
A.Vogel N.V.
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen

Fabricant
A.Vogel B.V.
P.O. Box 33
NL 8080 AA Elburg
Pays-Bas

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'enregistrement:
A.Vogel N.V.
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen
Tél: +32 (0)13 35 89 40
e-mail: info@avogel.be

Mode de délivrance
Médicament non soumis à prescription médicale.

Numéro de l'enregistrement
BE-TU488026

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 07/2019.

Gebrauchsinformation: Information für Anwender



ArnicaforceMed forte Gel

Arnica Montana L.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 8 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel beachten?
3. Wie ist A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel und wofür wird es angewendet?

A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das angewendet wird bei:

- Schmerzen
- Entzündungen infolge von Rheuma
- Gelenkschmerzen
- Rückenschmerzen
- Muskelkater
- Muskelzerrungen
- Muskel- und Gelenksteife
- Sehnenentzündungen
- Quetschungen
- Schwellungen infolge von Quetschungen
- Zerrungen
- Verstauchungen
- Blutergüssen infolge von Stößen

Die Anwendung beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Wenn Sie sich nach 8 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel beachten?

A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel darf nicht angewendet werden

- wenn Sie allergisch gegen das Extrakt aus frischen Arnika-montana-Blüten oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

- bei Überempfindlichkeit gegen Pflanzen aus der Familie der Korbblütler (Familie der Asteraceae bzw. Compositae).
- Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden. Kontakt mit den Augen, der Nase, dem Mund oder anderen sensiblen Bereichen vermeiden. Brechen Sie die Anwendung beim Auftreten von Hautrötungen, -reizungen oder bei Hauttrockenheit ab.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel anwenden.

Die angegebene Dosierung nicht überschreiten. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden. Kontakt mit den Augen, der Nase, dem Mund oder anderen sensiblen Bereichen vermeiden. A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel kann Hautreizungen hervorrufen. Brechen Sie die Anwendung beim Auftreten von Hautrötungen, -reizungen oder bei Hauttrockenheit ab.

Kinder

A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.

Anwendung von A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Anwendung von A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Während der Anwendung von A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel kann normal gegessen und getrunken werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft: Obwohl keine Nebenwirkungen beobachtet wurden, wird von der Anwendung während der Schwangerschaft abgeraten, es sei denn sie erfolgt unter ärztlicher Aufsicht. Ziehen Sie vor der Anwendung von A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel während der Schwangerschaft erst Ihren Arzt zurate.

Stillen: Es ist nicht bekannt, ob die Wirkstoffe von Arnikaextrakten in die Muttermilch übergehen. Daher ist von einer Anwendung während der Stillzeit abzuraten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Dieses traditionelle pflanzliche Arzneimittel hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

3. Wie ist A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Sofern nicht anders verordnet, die betroffenen Hautstellen 2 bis 4 mal täglich mit einer dünnen Schicht Gel (2 - 10 cm) vorsichtig einreiben. Bitte kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder wenn nach 2 Wochen ununterbrochener Anwendung keine Besserung der Beschwerden zu verzeichnen ist.

Wenn Sie eine größere Menge von A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel verwendet haben, setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder dem Antgiftzentrum (**070/245.245**) in Verbindung.

Wenn Sie mehr als die empfohlene Dosis von A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel angewendet haben, können Hautreizungen in Form von Rötungen auftreten. Brechen Sie in diesem Fall die Anwendung unverzüglich ab.

Im unwahrscheinlichen Fall einer Einnahme können als Folge der irritierenden Wirkung von Arnika Vergiftungserscheinungen auftreten wie Störungen des Verdauungsapparates und des Nervensystems; Schwindel, Diarrhö, Zittern und Herzklopfen. Bei der Einnahme von sehr hohen Dosen kann es zu Atemnot kommen. Behandlung einer Überdosierung: Der Magen muss durch Auspumpen oder Spülung geleert werden, sofern der Patient sich noch nicht übergeben hat. Es ist ein neutralisierendes Getränk wie Milch zu verabreichen.

Wenn Sie die Anwendung von A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel vergessen haben
Wenn Sie das Auftragen des Gels vergessen haben, fahren Sie mit der Anwendung wie gewohnt fort. Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, um die vergessene Dosis nachzuholen.

Wenn Sie die Anwendung von A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel abbrechen

Das Abbrechen der Anwendung bleibt ohne Auswirkungen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Folgende Beschwerden werden oft ($\geq 1/100$, $< 1/10$) beobachtet:
Jucken, Hautausschlag bzw. Hautreaktionen.
Brechen Sie sofort die Anwendung ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn diese Reaktionen Sie beunruhigen.

Fragen Sie Ihren Arzt, wenn die Symptome während der Anwendung dieses Arzneimittels weiterhin anhalten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte
Abteilung Vigilanz
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 BRÜSSEL
Website: www.fagg-afmps.be
E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel enthält

- Der Wirkstoff ist ein Extrakt aus frischen Arnika-montana-Blüten, 500 mg Extrakt pro 1 g Gel.
- Die sonstige Bestandteile sind Äthanol, gereinigtes Wasser, Glycerol und Ammoniumacryloyldimethyltaurat/VP Copolymer.

Wie A.Vogel ArnicaforceMed forte Gel aussieht und Inhalt der Packung

Das Gel ist in einer Tube zu 100 mg Gel abgepackt.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer

A.Vogel N.V.
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen

Hersteller

A.Vogel B.V.
P.O. Box 33
NL 8080 AA Elburg
Niederland

Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung:
A.Vogel N.V.
Bosstraat 54 bus 7
B-3560 Lummen
Tel: +32 (0) 13 35 89 40
E-mail: info@avogel.be

Art der Abgabe

Apothekenpflichtig.

Zulassungsnummer

BE-TU488026

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 07/2019.