

## Notice : information de l'utilisateur

### Melatonine PharmaNord 3 mg comprimés pelliculés

mélatonine

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

#### **Que contient cette notice ? :**

1. Qu'est-ce que Melatonine Pharma Nord et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Melatonine Pharma Nord ?
3. Comment prendre Melatonine Pharma Nord
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Melatonine Pharma Nord
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. Qu'est-ce que Melatonine Pharma Nord et dans quel cas est-il utilisé ?**

Melatonine Pharma Nord contient la substance active mélatonine. Melatonine Pharma Nord est à utiliser pour le traitement du syndrome du décalage horaire chez les adultes. Le syndrome du décalage horaire (« Jet-lag ») peut se manifester sous forme de troubles du sommeil, de fatigue durant la journée, d'un léger déficit cognitif, d'irritabilité et de troubles gastro-intestinaux qui apparaissent après le vol.

##### *Comment fonctionne Melatonine Pharma Nord*

La mélatonine est une hormone produite par l'organisme qui synchronise le rythme biologique jour-nuit de l'organisme. Le rythme biologique peut être perturbé après un voyage traversant plusieurs fuseaux horaires. Ceci est connu comme syndrome du décalage horaire. Les symptômes et leur gravité varient selon les individus, mais sont généralement plus nombreux et durent plus longtemps avec l'augmentation du nombre de fuseaux horaires traversés. Melatonine Pharma Nord peut aider à rétablir le rythme jour et nuit normal et réduire les symptômes.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 5 jours.

#### **2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Melatonine Pharma Nord ?**

##### **Ne prenez jamais Melatonine Pharma Nord :**

- si vous êtes allergique à la mélatonine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Melatonine Pharma Nord :

- si vous êtes épileptique. La mélatonine peut augmenter la fréquence des crises chez les patients souffrant d'épilepsie
- si vous avez une maladie auto-immune (dans laquelle l'organisme est « attaqué » par son propre système immunitaire)
- si vous souffrez de diabète ou d'intolérance au glucose, car ce médicament peut augmenter le taux de glucose dans le sang
- si vous souffrez d'une insuffisance hépatique ou rénale graves
- si vous fumez. Fumer peut diminuer l'effet de Melatonine Pharma Nord, car certains composants de la fumée de tabac peuvent augmenter la dégradation de la mélatonine par le foie.

### **Enfants et adolescents**

Ne donnez pas ce médicament aux enfants et aux adolescents âgés de moins de 18 ans, car sa sécurité et son efficacité ne sont pas connues.

### **Autres médicaments et Melatonine PharmaNord**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

- La fluvoxamine (utilisée pour traiter la dépression et le trouble obsessionnel compulsif), car la fluvoxamine peut augmenter l'effet de la mélatonine
- Les psoralènes (utilisés pour traiter des problèmes cutanés, par ex le psoriasis), car les psoralènes peuvent augmenter l'effet de la mélatonine
- La cimétidine (utilisée pour traiter des maladies de l'estomac comme les ulcères), car la cimétidine peut augmenter l'effet de la mélatonine
- Les œstrogènes (utilisés dans les contraceptifs ou l'hormonothérapie de substitution), car les œstrogènes peuvent augmenter l'effet de la mélatonine
- Les quinolones (utilisées pour traiter des infections bactériennes), car les quinolones peuvent augmenter l'effet de la mélatonine
- La rifampicine (utilisée pour traiter des infections bactériennes), car la rifampicine peut diminuer l'effet de la mélatonine
- La carbamazépine (utilisée pour traiter l'épilepsie), car la carbamazépine peut diminuer l'effet de la mélatonine
- Les benzodiazépines et les hypnotiques non benzodiazépines (médicaments utilisés pour induire le sommeil, comme le midazolam, témazépam et zaléplon, zolpidem, zopiclone), car la mélatonine peut renforcer l'effet sédatif de ces médicaments, et peuvent amplifier certains effets secondaires du zolpidem (sommolence matinale, nausées, confusion)

### **Melatonine PharmaNord avec des aliments et de l'alcool**

- Ce médicament ne doit pas être pris avec des aliments (voir rubrique 3).
- Comme l'alcool peut altérer le sommeil et potentiellement aggraver certains symptômes du décalage horaire (par exemple, maux de tête, fatigue matinale, concentration) il est recommandé de ne pas consommer d'alcool lors de la prise de ce médicament.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### *Grossesse*

Melatonine PharmaNord n'est pas recommandé si vous êtes enceinte. La mélatonine traverse le placenta et les informations manquent sur le risque que cela peut représenter pour l'enfant à naître. Si vous êtes une femme en âge de procréer, vous devez utiliser une méthode contraceptive.

### *Allaitement*

Melatonine PharmaNord n'est pas recommandé si vous allaitez. La mélatonine est excrétée dans le lait maternel, et un risque pour le nourrisson ou l'enfant allaité ne peut être exclu.

### *Fertilité*

Melatonine PharmaNord n'est pas recommandé chez les femmes et les hommes qui envisagent d'avoir un bébé, car il n'y a pas suffisamment d'information sur les effets de la mélatonine sur la fertilité féminine et masculine.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Melatonine PharmaNord peut provoquer de la somnolence et peut diminuer la vigilance pendant plusieurs heures après son administration. Par conséquent, ce médicament ne doit pas être administré avant de conduire ou d'utiliser des machines.

## **3. Comment prendre Melatonine PharmaNord**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée chez les adultes et les personnes âgées est de 1 comprimé par jour pendant au plus 5 jours. Lorsque l'effet de Melatonine PharmaNord est insuffisant, 2 comprimés peuvent être pris simultanément.

La première dose doit être prise à l'arrivée à destination à l'heure habituelle du coucher. Les jours suivants, l'administration doit également être à l'heure habituelle du coucher. Le(s) comprimé(s) ne doit/doivent pas être pris avant 20h00 ou après 04h00.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec de l'eau ou tout autre liquide (par exemple, lait, jus de fruits). Les aliments ne doivent pas être consommés dans les 2 heures qui précèdent ou qui suivent la prise de Melatonine PharmaNord.

Melatonine PharmaNord 3 mg peut être pris durant au maximum 16 périodes de traitement par an.

### **Si vous avez pris plus de Melatonine PharmaNord que vous n'auriez dû**

Si vous avez pris plus de Melatonine PharmaNord que recommandé et que vous ne vous sentez pas bien, veuillez contacter votre médecin, l'hôpital ou la pharmacie.

Les symptômes les plus fréquents de surdosage sont la somnolence, des maux de tête, des étourdissements et des nausées.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Melatonine PharmaNord, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245)

### **Si vous oubliez de prendre Melatonine PharmaNord**

Si vous oubliez de prendre le(s) comprimé(s) au moment du coucher et si vous vous réveillez pendant la nuit, vous pouvez prendre la dose oubliée, mais au plus tard à 04h00 du matin.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### **Si vous arrêtez de prendre Melatonine PharmaNord**

Si vous arrêtez de prendre Melatonine PharmaNord, il n'y aura pas d'effets nocifs ou des symptômes de sevrage.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **4. Quels sont les effets indésirables éventuels**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

### **Effets indésirables graves**

Si vous ressentez un des effets indésirables suivants, arrêtez de prendre ce médicament et consultez votre médecin *immédiatement* :

#### **Effets indésirables peu fréquents** (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Douleur thoracique.

#### **Effets indésirables rares** (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- Diminution du nombre de globules blancs dans le sang
- Diminution du nombre de plaquettes sanguines, ce qui augmente le risque de saignements ou d'écchymoses
- Désorientation
- Évanouissements
- Troubles visuels y compris vision floue
- Sentir votre rythme cardiaque (« martèlement dans la poitrine »)
- Sang (globules rouges) dans les urines.

#### **Fréquence indéterminée** (ne peut pas être estimée d'après les données disponibles)

- Réaction allergique grave entraînant un gonflement de la langue ou des muqueuses de la bouche

### **Effets indésirables non graves**

Si l'un de ces effets indésirables non graves se produit, informez votre médecin ou votre pharmacien :

#### **Effets indésirables fréquents** (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Maux de tête
- Somnolence.

#### **Effets indésirables peu fréquents** (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Irritabilité, nervosité, agitation, rêves anormaux, anxiété
- Sensation vertigineuse
- Tension artérielle élevée
- Douleurs abdominales, douleurs abdominales hautes, indigestion, ulcération buccale, sécheresse de la bouche, nausées
- Démangeaisons, rash, peau sèche
- Excrétion de glucose dans l'urine, excès de protéines dans l'urine
- Sensation d'être malade
- Poids augmenté.

#### **Effets indésirables rares** (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- Taux élevés de certaines molécules de graisse (triglycérides) dans le sang

- Altération de l'humeur, agressivité, augmentation de la libido
- Atteinte de la mémoire, syndrome des jambes sans repos, sensation de picotements cutanés
- Larmolement
- Bouffées de chaleur
- Vomissements, flatulence, excès de salive, mauvaise haleine, inflammation de la muqueuse de l'estomac
- Troubles unguéaux
- Arthrite, spasmes musculaires
- Augmentation du volume des urines
- Érection prolongée pouvant s'avérer douloureuse, inflammation de la glande prostatique
- Soif
- Taux anormaux des électrolytes sanguins.

**Fréquence indéterminée** ((ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Réactions d'hypersensibilité
- Niveau de glucose élevé dans le sang
- Écoulement spontané de lait des seins (également chez les hommes).

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé  
Division Vigilance

EUROSTATION II Place Victor Horta, 40/40 B-1060 Bruxelles	Boîte Postale 97 B-1000 Bruxelles Madou
---	---

Site internet: [www.afmps.be](http://www.afmps.be)

e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. Comment conserver Melatonine PharmaNord**

- Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
- N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et les plaquettes après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
- Ce médicament ne nécessite aucune précaution particulière de stockage.
- Melatonine PharmaNord doit être conservé dans l'emballage d'origine afin de protéger contre la lumière.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

**6. Contenu de l'emballage et autres informations**

**Ce que contient Melatonine PharmaNord**

- La substance active est la mélatonine. Chaque comprimé contient 3 mg de mélatonine.
- Les autres composants sont : stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, maltodextrine, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique. *Pelliculage* : hypromellose.

**Aspect de Melatonine PharmaNord et contenu de l’emballage extérieur**

Comprimé rond, biconvexe, recouvert d’un enrobage transparent, de couleur blanche ou blanc cassé. Diamètre 7,5 mm.

Plaquettes contenant 10 au 30 comprimés pelliculés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché :**

BE546053

**Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant**

Pharma Nord Aps  
Tinglykke 4-6  
DK-6500 Vojens  
Danemark

**Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l’Espace Economique Européen sous les noms suivants :**

Belgique	Melatonine Pharma Nord 3 mg comprimés pelliculés / filmomhulde tabletten / Melatonin Pharma Nord 3 mg Filmtabletten
Estonie	Melatoniin Pharma Nord 3 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Hongrie	Melatonin Pharma Nord 3 mg filmtabletta
Irlande	Melatonin Pharma Nord 3 mg film-coated tablets
Lettonie	Melatonin Pharma Nord 3 mg apvalkotās tabletes
Lituanie	Melatoninas Pharma Nord 3 mg plėvele dengtos tabletės
Pays-Bas	Melatonine Pharma Nord 3 mg filmomhulde tablet
Pologne	Melatonina Pharma Nord 3 mg tabletki powlekane
Portugal	Melatonina Pharma Nord 3 mg, comprimidos revestidos por película
Espagne	Melatonite 3 mg comprimidos recubiertos con película
Royaume-Uni	Syncrocin 3 mg film-coated tablets

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 06/2020.**